

正誤情報

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	誤	正
34頁「川崎病」2つめの段落	▶病初期には発熱のみしかみられず、3～5日の発熱が続き、他の症状がそろってきょうやく診断できる。すべての症状がそろわない不全型もあり、診断が悩ましいこともある。	▶病初期には発熱のみしかみられず、他の症状がそろってきょうやく診断できる。すべての症状がそろわない不全型もあり、診断が悩ましいこともある。2019年に発熱の持続日数は削除された。

頁	誤	正
34頁 主要症状	①5日以上続く発熱（ただし、治療により5日未満で解熱した場合も含む） ④不定形発疹	①発熱 ④発疹（BCG接種痕の発赤を含む）

頁	誤	正
116頁 表36	アドレナリン*（ボスミン®外用液0.1%）	アドレナリン*（ボスミン®外用液0.1%：吸入）

頁	誤	正
240頁 18行目	⑪と⑫は“聴診三角”と言い、僧帽筋外側下縁と広背筋上筋、肩甲骨下骨内側円に囲まれた筋層の薄い三角部位である。	⑮と⑯は“聴診三角”と言い、僧帽筋外側下縁と広背筋上筋、肩甲骨下骨内側円に囲まれた筋層の薄い三角部位である。

頁	誤	正
295頁 13行目	麻黄は、マオウ科マオウなどの植物の地下茎。	麻黄は、マオウ科マオウなどの植物の地上茎。

頁	誤	正
296頁「葛根湯加川芎辛夷」、297頁「辛夷清肺湯」	※：クラシエは、1包2.5gと1包3.0gの2種類あり	※：クラシエは、1包2.5gと1包3.75gの2種類あり

頁	誤	正
背表紙	編：永田理希	著：永田理希